

Pillenwarnung vom 7. November 2008

Ecstasy-Falsifikate mit diversen Wirkstoffen im Umlauf!

Pillenwarnung per E-Mail von Alexander Bücheli (Streetwork Zürich) vom 3. November 2008

von Hans Cousto, Eve & Rave Berlin

Derzeit sind Ecstasy-Falsifikate mit dem Wirkstoff Meta-Chlorphenylpiperazin (m-CPP) im Umlauf. Es handelt sich dabei um weiße Pillen mit dem Logo »Rolex« mit Bruchrille aus unterschiedlichen Chargen mit unterschiedlichen Maßen und Gewichten. Zudem sind beige Pillen mit gleichem Logo und farbigen Sprenkeln mit m-CPP, Coffein und Amphetamin im Umlauf sowie rosa gespenkelte Pillen mit den gleichen Inhaltsstoffen ohne Logo (*No Name*) und Bruchrille. Nach dem Konsum von Pillen mit dem Wirkstoff m-CPP kommt es oft zu heftigen und unangenehmen Nebenwirkungen, wobei meistens nur sehr wenig eines erwünschten psychotrop wirkenden Effekts zu spüren ist.

Ecstasy-Falsifikate mit dem Wirkstoff 2C-B (Bromdimethoxyphenethylamin = BDMPEA) tauchen derzeit im gesamten deutschsprachigen Raum auf. Es handelt sich dabei um Pillen mit dem Logo »Rolex« mit Bruchrille in den Farben Gelb, Orange, Ziegelrot, Hellgrün und Hellgrün mit Sprenkeln. Der Grundeffekt von 2C-B ist eine Steigerung der Sinneswahrnehmungen, es verstärkt die Gefühlsempfindungen und wirkt in höheren Dosierungen halluzinatorisch. Zudem wird 2C-B als Aphrodisiakum bei Frigidität und Impotenz und zur Steigerung der Libido eingesetzt.

Vorsicht, diese Pillen enthalten m-CPP und kein MDMA



Photos: Streetwork Zürich

Logo:	Rolex	Rolex	Rolex
Farbe:	weiß mit beigen Sprenkeln	weiß mit beigen Sprenkeln	weiß mit beigen Sprenkeln
Bruchrille:	ja	ja	ja
Durchmesser:	9,1 mm	9,3 mm	9,2 mm
Dicke:	3,5 mm	3,7 mm	4,1 mm
Gesamtgewicht:	227,5 mg	280,2 mg	307,6 mg
Wirkstoff:	48,4 mg m-CPP	38,6 mg m-CPP	49,1 mg m-CPP
Testort, Testzeit:	Zürich, Oktober 2008	Roggwil (Kanton Bern), Oktober 2008	Zürich, Oktober 2008

Vorsicht, diese Pillen enthalten m-CPP und Coffein



Photos: Streetwork Zürich

Logo:	Rolex	No Name I	No Name II
Farbe:	beige mit farbigen Sprenkeln	rosa mit farbigen Sprenkeln	rosa mit dunkelroten Sprenkeln
Bruchrille:	ja (schwach ausgeprägt)	nein	nein
Durchmesser:	8,2 mm	8,8 mm	8,2 mm
Dicke:	4,7 mm	4,5 mm	4,0 mm
Gesamtgewicht:	291,8 mg	280,4 mg	243,3 mg
Wirkstoffe:	22,4 mg m-CPP 64,7 mg Coffein 3,1 mg Amphetamin	22,6 mg m-CPP 40,0 mg Coffein 4,5 mg Amphetamin	16,4 mg m-CPP 12,0 mg Coffein <0,1 mg MDMA
Testort, Testzeit:	Zürich, Oktober 2008	Zürich, Oktober 2008	Zürich, Oktober 2008

Meta-Chlorphenylpiperazin (m-CPP)

Meta-Chlorphenylpiperazin [1-(3-Chlorphenyl)piperazin] ist ein Piperazinderivat, das allgemein und vornehmlich nur unter dem Namen **m-CPP** respektive **mCPP** bekannt ist. Das »m« steht für »meta« und bezeichnet die Position des Chloratoms (an Position drei) am Phenylring und »CPP« steht für Chlor-phenylpiperazin. Weitere Bezeichnungen für m-CPP sind 3-CPP respektive 3CPP.

Der Konsum von **m-CPP** kann leicht zu Depressionen, Angstzustände, psychomotorischer Unruhe sowie zur Störung der Sexualfunktionen führen. Gebraucher dieser Substanz verspüren neben der eher schwach ausgeprägten wahrnehmungsverändernden Wirkung der Substanz (Glücksgefühle und optische Veränderungen) vor allem Kopfschmerzen und fühlen sich müde und deprimiert und leiden nicht selten mehrere Tage an einer lang andauernden Niedergeschlagenheit. Es wird auch von Nervosität und Schweratmigkeit berichtet und den Konsumenten wird oft übel und sie müssen nicht selten erbrechen. Häufig überwiegen jeweils die negativen und unangenehmen Nebenwirkungen im Vergleich zu den erwünschten Wirkungen, die nur bedingt und schwach zu verspüren sind.

Nach dem Konsum von **m-CPP** kann sich der Urin in eine rostbraune bis rötliche Farbe verfärben. Diese Verfärbung verschwindet wieder nach zwei bis drei Tagen. Wer also solche Pillen konsumiert hat, muß nicht gleich in Panik verfallen, wenn sein (ihr) Urin auf einmal nicht mehr die übliche Farbe haben sollte. Dauert die Verfärbung jedoch länger als drei Tage an, dann ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen.

Die Substanz **m-CPP** wurde in der Bundesrepublik Deutschland mit der 20. Betäubungsmittelrechts-Änderungsverordnung (20. BtMÄndV) vom 14. Februar 2007 mit Wirkung ab dem 1. März 2007 in Anlage II zu § 1 BtMG (verkehrs-fähige, aber nicht verschreibungsfähige Betäubungsmittel) aufgenommen. Die Substanz **m-CPP** unterliegt somit seit März 2007 den betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften.

Vorsicht, diese Pillen enthalten 2C-B und kein MDMA



Photos: Streetwork Zürich

Logo:	Rolex	Rolex	Rolex
Farbe:	hellgrün	gelb-orange	gelb-orange
Bruchrille:	ja	ja	ja
Durchmesser:	8,1 mm	8,1 mm	8,2 mm
Dicke:	2,7 mm	2,4 mm	2,8 mm
Gesamtgewicht:	162,25 mg	165,6 mg	154,7 mg
Wirkstoff:	5,3 mg 2C-B	5,2 mg 2C-B	7,0 mg 2C-B
Testort, Testzeit:	Zürich, September 2008	Zürich, September 2008	Zürich, Oktober 2008



Photos: Streetwork Zürich

Logo:	Rolex	Rolex	Rolex
Farbe:	hellgrün mit farbigen Sprenkeln	gelb bis gelb-orange mit dunkeln Sprenkeln	ziegelrot
Bruchrille:	ja	ja	ja
Durchmesser:	8,2 mm	8,0 mm	8,2 mm
Dicke:	2,7 mm	2,5 mm	2,7 mm
Gesamtgewicht:	166,2 mg	159,6 mg	167,3 mg
Wirkstoffe:	6,6 mg 2C-B	3,5 mg 2C-B	5,8 mg 2C-B 2,6 mg Coffein
Testort, Testzeit:	Roggwil (Kanton Bern), Oktober 2008	Zürich, Oktober 2008	Roggwil (Kanton Bern), Oktober 2008

2C-B (BDMPEA)

Wirkstoff: 4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamin
Psychostimulans mit halluzinogener und stark aphrodisischer Wirkung

2C-B (BDMPEA) ist in Anlage 1 zu § 1 BtMG aufgeführt und ist somit in der Bundesrepublik Deutschland weder verkehrsfähig noch verschreibungsfähig. Eine reguläre medizinische Anwendung ist deshalb in der Bundesrepublik Deutschland nicht statthaft.

Anwendung: Psychotherapie und psycholytische Therapie
Bei Frigidität (Empfindungslosigkeit der Frau in Bezug zum Geschlechtsverkehr)
Impotenz (Unfähigkeit des Mannes zum Geschlechtsverkehr)
Steigerung der Libido (Begierde, Geschlechtstrieb)
Intensivierung der optischen und akustischen Wahrnehmung
Wahrnehmungsintensivierend (taktil, den Tastsinn betreffend)
Intensivierung der Liebesempfindung (entaktogener und empathogener Effekt)

Medizinisch wurde 2C-B in diversen Ländern als Aphrodisiakum in Dosierungen zwischen 5 mg bis 20 mg eingesetzt. Die handelsüblichen Tabletten hatten 5 mg Wirkstoff. 2C-B hat auch eine halluzinogene und entaktogene Wirkung. Die Wirkungsdauer beträgt je nach Dosierung etwa 4 bis 8 Stunden.

Dosierung und Wirkungsspektrum

In Dosierungen unter 20 mg steigert 2C-B das sexuelle Verlangen und die Potenz. Es wirkt leicht stimulierend, führt zu einer leichten Euphorie, die einhergeht mit einer Verstärkung des Körperbewußtseins und der Empfänglichkeit für visuelle, akustische und sensorische Reize.

Bei höheren Dosierungen von 25 mg und mehr, werden nicht selten sehr intensive, lebhaft, jedoch oft auch erschreckende Halluzinationen beobachtet. Die halluzinogenen Erlebnisse werden individuell oft so stark empfunden, daß sie ungeübte Personen völlig überfordern. Ein langsames, behutsames Antasten der Dosis in Schritten à 5 mg ist verträglicher.

Die Wirkung tritt bei bis zu 20 mg innerhalb 20 bis 30 Minuten nach der oralen Einnahme des etwas bitteren Hydrochlorids auf. Schon sehr bald zeigen sich typische Rauschsymptome, gelegentlich auch Schwindel und Blutdruckerhöhung. In seltenen Fällen kann es nach etwa einer Stunde zu Koordinationsschwierigkeiten kommen, da der Seh- und der Gehörsinn zuweilen zu verschmelzen scheinen. Es kann zu stark psychedelisch ausgeprägten Auflösungserscheinungen im Rausch der Töne, Farben und Gefühle kommen. Die ersten zwei bis vier Stunden sind meist von einem starken Antrieb und sexueller Lust gekennzeichnet, später tritt meist eine ruhigere Phase ein, in der aber die Halluzinationen anhaltend stark und farbenprächtig bleiben. Bei höheren Dosierungen verlängert sich die Wirkung deutlich, doch die negativen Nebeneffekte nehmen bei höheren Dosierungen auch beträchtlich zu.

Dosierung: Als Aphrodisiakum bei Frigidität und Impotenz und zur Steigerung der Libido: Anfangsdosis 5 mg, nach Bedarf Erhöhung der Dosis um 5 mg

Für alle anderen Anwendungsgebiete (therapeutische Sitzungen, schamanische Rituale, spirituelle Übungen, Trance- und Cyberrealitätsreisen) genügt bei psychisch und physisch gesunden Personen im allgemeinen eine Dosis von 10 mg (2 Tabletten) bis 20 mg (4 Tabletten).

Es sollten – auch von erfahrenen Psychedelikern – nicht mehr als 5 Tabletten (25 mg) eingenommen werden, da in höheren Dosierungen mit unangenehmen Nebenwirkungen gerechnet werden muß.

Hinweise

2C-B sollte nicht nach den Mahlzeiten eingenommen werden und bis zur vollen Wirkungsentfaltung sollte auf Nahrungsaufnahme verzichtet werden. Frische, alkoholfreie Getränke und Obst sollten stets vor Ort zugänglich sein. 2C-B unerfahrene Personen sollten als Anfangsdosis nicht mehr als eine Pille/Tablette mit 5 mg Wirkstoff einnehmen und erst bei Bedarf während der Wirkungszeit die Dosis steigern. Unerfahrene Personen mit Psychedelika sollten niemals 2C-B ohne erfahrene fach- und sachkundige Begleitpersonen einnehmen.

Gegenanzeigen

2C-B sollte niemals angewendet werden, wenn die betreffende Person Angst vor der Droge hat, da dies beim Auftreten von Halluzinationen zu Irritationen und zu verstärkten Angstzuständen führen kann. 2C-B sollte nur angewendet werden, wenn die Person sich sicher ist, daß die Substanz ihr gut tut.

Personen mit Asthma, Anämie (Blutarmut), Herz-Kreislauf-Störungen, Diabetes (Zuckerkrankheit) und Epilepsie sollten niemals 2C-B gebrauchen. Personen mit zu hohem Blutdruck sollten 2C-B nur in geringen Dosen (5 mg) einnehmen. Dies gilt auch für Personen, die an chronischer Hepatitis leiden und/oder eine Leberzirrhose haben.

2C-B sollte niemals ohne ärztliche Begleitung angewendet werden, wenn die betreffende Person in psychiatrischer Behandlung ist und/oder Medikamente zur psychischen Stabilisierung einnehmen muß.

2C-B sollte nicht angewendet werden, wenn man zuvor viel Alkohol getrunken hat und/oder Amphetamin, Methamphetamin oder Kokain konsumiert hat, da mit verstärkten unangenehmen Nebenwirkungen gerechnet werden muß.

Nebenwirkungen

Die Anwendung von 2C-B führt unter Umständen zu Hyperisotonie (einem Ansteigen des Blutdrucks und erhöhtem Druck der Körperflüssigkeiten), zu Tachykardie (Herzklopfen), zu Kribbeln auf der Haut und zu plötzlichen Schweißausbrüchen. Manche Personen bekommen auch Schwindelanfälle sowie Brechreiz. Andere berichten von plötzlich auftretenden Halluzinationen und Orientierungslosigkeit. Obwohl diese Nebeneffekte ziemlich unangenehm sein können, dauern sie zumeist nur kurze Zeit und gehen meist bald wieder weg; man sollte deshalb nicht in Panik geraten. Im allgemeinen kann man nach dem Gebrauch von 2C-B leicht Schlaf finden, Katersymptome am nächsten Morgen sind eher selten und individuell und dosisabhängig.

2C-B entwickelt eine Toleranz. Deshalb ist nach der Einnahme von 2C-B eine Pause von mindestens einer Woche nötig, bis eine erneute Einnahme die gleiche Intensität an Wirkung hervorrufen kann wie bei der ersten Einnahme. Die Dosis muß nach einer solchen Pause jedoch nicht erhöht werden.

Mischkonsum

Es wird viel über die Kombination von MDMA und 2C-B berichtet. Dabei ist zu beachten, daß die gleichzeitige Einnahme von beiden Substanzen leicht zu Verwirrungen führen kann. 2C-B entwickelt die besten Eigenschaften in Kombination mit MDMA, wenn 2C-B etwa fünf bis sechs Stunden nach der Einnahme von MDMA appliziert wird, also dann, wenn die MDMA-Wirkung langsam nachzulassen beginnt. Die umgekehrte Reihenfolge wird von vielen Probanden eher als unangenehm beschrieben.

Quellen

Drittwelle: 2C-B Fact Sheet (Erox deliveries), Grand Turk, Turks and Caicos Islands, British West Indies, Juli 1995

Hans Cousto: Vom Urkult zur Kultur – Drogen und Techno, Solothurn 1995, S. 226 ff.

Daniel Trachsel, Nicholas Richard: Psychedelische Chemie, Solothurn 2000, 3. Auflage S. 56 ff.

Hochdosierte MDMA-Pillen, z.T. mit Coffein und Amphetamin



Photos: Streetwork Zürich

Logo:	Euro	Stier (Doppellogo)	Tatzenkreuz (Keltenkreuz)
Farbe:	beige mit rosa Stich	hellbeige mit Sprekeln	gelb
Bruchrille:	nein	nein (Logo auf beiden Seiten)	nein
Durchmesser:	8,1 mm	7,1 mm	9,2 mm
Dicke:	3,3 mm	5,7 mm	4,1 mm
Gesamtgewicht:	203,0 mg	262,7 mg	293,2 mg
Wirkstoffe:	120,8 mg MDMA	121,6 mg MDMA	106,8 mg MDMA 30,5 mg Coffein 4,0 mg Amphetamin
Testort, Testzeit:	Roggwil (Kanton Bern), Oktober 2008	Roggwil (Kanton Bern), Oktober 2008	Zürich, Oktober 2008

Die Wirkstoffmenge von Ecstasy (MDMA) wird manchmal als freie Base und manchmal als Hydrochlorid (HCl-Salz) angegeben. Die meisten Phenylalkylamine wie MDMA, MDE und MBDB werden als HCl-Salz auf den Markt gebracht, da das freie Amin meistens nicht wasserlöslich ist und zudem einer schnelleren Zersetzung unterliegt. In den Pillenwarnungen von Eve & Rave sind die Wirkstoffmengen jeweils als Hydrochlorid angegeben.

Dosierungen bezüglich Ecstasy werden in der Literatur fast durchgehend als Hydrochlorid angegeben. Als Faustregel gilt bei MDMA ein oberer Grenzwert von 1,5 Milligramm pro Kilo Körpergewicht. Je nach Konstitution und Gewöhnung des Konsumenten kann eine Überschreitung dieser Grenzwerte zu einer Überdosierung mit unangenehmen Folgen für die Befindlichkeit führen. Die in der Regel zu angenehmen Empfindungen führenden Dosierungen liegen etwa 20 Prozent unterhalb dieser Grenzwerte. Bei dem Konsum von Ecstasy sind auch bei Einhaltung der Angaben zur Dosierung Risiken und Nebenwirkungen nicht gänzlich auszuschließen, dies gilt insbesondere bei Mischkonsum.

In der folgenden Tabelle sind die oberen Grenzwerte zur Dosierung von MDMA in Relation zum Körpergewicht aufgelistet.

Körpergewicht	MDMA	Körpergewicht	MDMA
50 Kg	75 mg	80 Kg	120 mg
60 Kg	90 mg	90 Kg	135 mg
70 Kg	105 mg	100 Kg	150 mg

Weitere Informationen zu Ecstasy, siehe: <http://www.drogenkult.net/?file=Ecstasy>

Allgemeine Informationen zu Drug-Checking

Eve & Rave Berlin

Drug-Checking: Download von Drug-Checking Informationen, Pillenwarnungen und Ergebnissen

<http://www.eve-rave.net/abfahrer/download.sp?cat=1>

Allgemeine Informationen

<http://www.eve-rave.net>

Eve & Rave Schweiz

Pillenwarnungen

<http://www.eve-rave.ch/content/blogcategory/18/61/>

Allgemeine Informationen

<http://www.eve-rave.ch>

Streetwork Zürich / Saferparty Zürich

Pillenwarnungen

<http://www.saferparty.ch/de/testing/warning/>

Allgemeine Informationen

<http://www.saferparty.ch>

20 Jahre Pill-Testing / Drug-Checking in Zürich

Referate von Alexander Bücheli [Drug-Checking in Zürich (Streetwork Zürich; Saferparty Zürich)] und Hans Cousto [20 Jahre Pill-Testing (Eve & Rave e.V. Berlin)] gehalten am Sonics Netzwerk Jahrestreffen vom 25. bis 27. April 2008 in Leipzig.

<http://www.eve-rave.net/abfahrer/drugchecking.sp?text=240&page=0>

Format: PDF, Größe: 201 KB, 12 Seiten

<http://www.eve-rave.net/abfahrer/download/eve-rave/dc127.pdf>

Die Anfragen mit Suchmaschinen bei www.eve-rave.net nach der Substanz Ecstasy (ohne Anfragen nach MDMA) lauteten im ersten Halbjahr 2007 wie folgt: Ecstasy (60%), Extasy (19%), XTC (11%), Extacy (5%), Ectasy (2,5%), Exstasy (0,9%), Ecstacy (0,8%), Exctasy (0,5%), Ecxtasy (0,3%) sowie Extasi (0,0%). Offensichtlich informieren sich zahlreiche Leute im Internet, die in Sachen Rechtschreibung mangelhafte Kenntnisse haben – aber einen Computer bedienen können und Suchmaschinen richtig benutzen können – und vor allem Drogenkompetenz erlangen wollen!